بطاقات الإلتهابات المنقولة جنسيّاً

بطاقات إسم الإلتهاب المنقول جنسيّاً	بطاقات هل يوجد لقاح؟	بطاقات الوقاية
الزهري	لا	يؤمّن الواقي حماية جيّدة لكن يجب إستخدامه طوال العملية الجنسيّة.
قمل العانة	لا	يؤمّن الواقي حماية جيّدة لكن يجب إستخدامه طوال العملية الجنسيّة.
الكلاميديا	لا	يؤمّن الواقي حماية جيّدة لكن يجب إستخدامه طوال العملية الجنسيّة. قد لا يعلم الشخص بأنه حامل هذه العدوى البكتيرية بسبب غياب العوارض، لذلك من الأفضل إستخدام الواقي كلّ الوقت لتأمين أكبر قدر من الحماية
إلتهاب الكبد الوبائي	لا	يؤمّن الواقي حماية جيّدة لكن يجب إستخدامه طوال العملية الجنسيّة. كما يجب عدم مشاركة الحقن والأدوات الجراحية غير المعقّمة أو شفرات الحلاقة مع آخرين. على المرأة الحامل أن تعلم طبيبها.
فيروس نقص المناعة البشري	لا	يؤمّن الواقي حماية جيّدة لكن يجب إستخدامه طوال العملية الجنسيّة. أما إذا كان هناك قروح لا يغطيها الواقي، فيجب الإمتناع عن ممارسة الجنس حتى الشفاء.
الهربس التناسلي	لا	على حاملي هذا النوع الإلتهابات أن يستخدموا الواقي دائماً بما أنه ليس هناك علاج شافي تماماً، وبما أنه ينتقل حتى عندما تزول العوارض. عند معاودة العوارض، على حامل الهربس أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط جنسي بما أن الواقي قد لا يكون كافياً لحماية الشريك. كما يجب غسل اليدين جيّداً من أجل التأكّد من أن العدوى لن تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسد.
فيروس الورم الحُليمي البشري	نعم	الإلتزام بقواعد النظافة الشخصيّة وتجنّب الإتصال الجنسي مع شخص مصاب الى حين شفائه، وكذلك تجنّب مشاركته الألبسة والفراش.
داء المشعرات المهبليّة	نعم	يؤمّن الواقي حماية جيّدة لكن يجب إستخدامه طوال العملية الجنسيّة. كما يجب عدم مشاركة الحقن والأدوات الجراحية غير المعقّمة أو شفرات الحلاقة مع آخرين. على المرأة الحامل أن تعلم طبيبها كي يطلعها على طرق الوقاية ويتابعها لمنع إنتقال الفيروس الى الجنين. إذا شكّ الشخص بإحتمال إنتقال العدوى إليه فإن هناك علاج وقائي (prophylactic) يتمّ أخذه خلال الـ٣٦ساعة من لحظة الإحتكاك مع الدم أو السوائل الجنسيّة غير الموثوق بها، وذلك لمنع إنتشار العدوى في الجسم.

بطاقات العوارض لدى المرأة ولدى الرجل	بطاقات سبل العلاج وإمكانية الشفاء
فترات متكرّرة من التقرّح المؤلم في الأعضاء التناسليّة أو الشرج.	**نعم**. لكن إذا لم يتم معالجتها قد تزيد من نسبة التعرض لأنواع أخرى من الإلتهابات. **خصائص إضافية**: تنتقل عبر احتكاك الجلد بالقروح المفتوحة الى مناطق أخرى من الجسم، خاصة لدى مداعبة المناطق التناسلية المصابة باليد ونقل العدوى الى شخص غير مصاب أو الى منطقة أخرى من الجسم عبر اليد الملوثة.
بعض الناس يختبرون عوارض شبيهة بعوارض الإنفلونزا واليرقان (الصفيرة) ويكون البول لديهم داكن اللون. والبعض قد لا يختبر أيّة عوارض.	على الرغم من أنه لم يتم العثور على علاج شافٍ لالتهاب الكبد الفيروسي –ب، إلاّ أنه في كثير من الحالات يتخلّص الجسم من العدوى من تلقاء نفسه. أحيانا قد يتطور الى مرض مزمن في الكبد. الأطفال والرضّع هم في خطر أكبر أن تصبح إصابتهم مزمنة. **خصائص إضافيّة**: يتنقل أيضاً عبر الدم الملوّث بالفيروس ومن المرأة الحامل إلى طفلها.
النساء: معظمهنّ لا يظهرن أيّة عوارض. قد تظهر لديهنّ إفرازات مهبليّة غير عاديّة أو يشعرن بحريق عند التبوّل **الرجال**: إفرازات من القضيب أو حريق عند التبوّل. بعض الرجال لا تظهر عليهم أيّة عوارض.	**كلاّ**، ولكن يمكن التحكّم بالعوارض من خلال العلاج. **خصائص إضافيّة**: قد تنقل المرأة الحامل العدوى الى طفلها. يوجد نوع من الهربس الذي يصيب الفم ويمكن أن ينتقل من الفم الى الأعضاء التناسلية والعكس.
تبدأ بواحدة أو أكثر من القروح غير المؤلمة على الأعضاء التناسليّة والمستقيم، أو الفم. قد نلاحظ في المرحلة الثانية الطفح الجلدي، والجروح أو الضرر في الأغشية المخاطيّة، والحمى، والشعور بالإنزعاج. أمّا المرحلة الكامنة فتبدأ عندما تزول هذه العوارض.	**نعم** ، إذا تم علاجه في مراحله المبكرة. بدون علاج ، تبقى العدوى في الجسم. في مرحلة متأخرة من مرض الزهري، يلحق الضرر بالأعضاء الداخلية ويمكن أن يكون قاتلاً. **خصائص إضافيّة**: قد تنقل المرأة الحامل العدوى الى طفلها. كما تنتقل العدوى أيضاً عبر الجنس الفموي.
يمكن أن يكون بدون عوارض. بعض سلالات الفيروس تسبّب الثآليل التناسليّة.	**نعم**، لكن إذا تُركت دون علاج، قد تودّي الى مرض إلتهاب الحوض لدى النساء مما قد يؤدّي الى العقم.أما المضاعفات لدى الرجال فهي نادرة **خصائص إضافيّة**: قد تنقل المرأة الحامل العدوى الى طفلها مما قد يسبب لديه التهاب في الرئتين أو في العينين.

بطاقات العوارض لدى المرأة ولدى الرجل	بطاقات سبل العلاج وإمكانية الشفاء
إلتهاب، وتهيّج و/أوحكة شديدة في منطقة شعر العانة وحولها.	**نعم**، لكن إذا تُركت دون علاج، قد تودّي الى مرض إلتهاب الحوض لدى النساء، وقد تؤدّي إلى العقم لدى الرجال والنساء على حدّ سواء. **خصائص إضافيّة**: قد تنقل المرأة الحامل العدوى الى طفلها مما قد يسبب لديه العمى. ممكن أن ينتقل أيضاً عبر احتكاك السائل المنوي أو الإفرازات المهبلية مع الفم أو العين.
غالباً لا تظهر العوارض لدى النساء. أما العوارض بالنسبة للمرأة والرجل فهي قروح مؤلمة على الأعضاء التناسلية، تضخم الغدد الليمفاوية في الفخذ.	**كلاّ**، ولكن يمكن التحكّم بالعوارض من خلال العلاج. بعض سلالات الفيروس قد تتطوّر لتسبّب سرطان عنق الرحم لدى النساء. **خصائص إضافية**: في حال سبب الفيروس الثآليل التناسليّة (Genital warts)، فيمكن إزالتها في العيادة بواسطة التجميد أو الحرارة أو الطلاء الكيميائي. يمكن للثآليل أن تعود.
النساء: معظمهن لا يظهرن أيّة عوارض. قد تظهر لديهنّ إفرازات مهبليّة غير عاديّة أو يشعرن بحريق عند التبوّل. **الرجال**: غالباً ما لاتظهر العوارض لديهم. قد تكون إفرازات من القضيب شبيهة بالقيح أو حريق عند التبوّل.	**كلاّ** ، فالإيدز مرض مزمن، ويؤدّي في النهاية إلى الوفاة. ولكن العلاج (العلاج المضاد للفيروسات– Antiretroviral therapy) يبطئ تقدم المرض بشكل كبير . **خصائص إضافيّة**: يتّنقل أيضاً عبر الدم الملوّث بالفيروس ومن المرأة الحامل الى طفلها.
عموماً، ليس لفيروس نقص المناعة البشري أية عوارض في مراحله المبكرة. لكنّه عادةً يؤدي الى مرض الإيدز. ونتيجة لتدهور المناعة قد يعاني مرضى الإيدز من الإلتهابات والسرطانات المختلفة، وغيرها من الامراض التي تهدد الحياة.	**نعم**. يستخدم غسول طبّي خاص على كامل الجسم وكريم طبّي لتخفيف الحكة. كما يتوجب غسل أغطية الأسرة والثياب. **خصائص إضافية**: يمكن أيضاً انتقاله عن طريق المشاركة في استعمال أغطية الأسرة أو الثياب مع شخص مصاب بالعدوى.
يمكن للنساء أن تختبر وجود إفرازات مهبلية صفراء–خضراء ذات رائحة قوية. قد يسبب أيضاً الحكّة أو عدم الراحة أثناء الجماع وأثناء التبوّل.	**نعم**